




Parkinsonismes

MSA, PSP, LBD, CBD,
Vasculaire parkinsonisme



MSA

-Multi systeem atrofie (P staat voor Parkinson,C staat voor Cerebellair)

Oorzaak: opstapeling van verkeerd gevouwen eiwit α -synucleïne (Lewy Lichaampjes)

Verschijselen:

- Stijfheid
- Traagheid
- Balansproblemen
- Autonomieklachten: lage bloeddruk, plasklachten, obstipatie, minder zweten(waardoor oververhiting), minder traanvocht, minder speeksel
onregelmatige hartslag, erectiestoornissen
- Tremor
- Spraakstoornissen/ dronkemanspraak
- Slechter zicht doordat ooglenz zich niet automatisch aanpast
- Bij cerebellaire MSA ook nog schokkende bewegingen , stuurloosheid (ataxie)

Verloop

- Ca 50-60 jaar start
- Overlijden Meestal binnen 6-9 jaar
- Mannen/vrouwen gelijk verdeeld

PSP

Progressieve supranucleaire paralyse

Oorzaak: de beschadiging wordt veroorzaakt door het Tau eiwit

Verschijnselen

- Ogen niet goed kunnen richten (boven beneden), gericht kijken is moeilijk Oogleden worden vaak opgetrokken waardoor verbaasde blik, ogen kunnen niet tegelijk op 1 voorwerp worden gericht waardoor een onscherp zicht
- Klachten aan beide zijden van het lichaam
- Evenwichtstoornissen met vallen als gevolg
- Bewegingstraagheid, stijfheid in nek en rugspieren
- Gedragsproblemen zoals apathie, geïrriteerd raken, snel wisselende emoties
- Moeite met planning
- Beven komt minder vaak voor maar kan wel dan beide zijden en tijdens bewegen

Verloop

- Start na 40 ste levensjaar
- Overlijden: meestal na 6 jaar maar kan ook langer duren
- Komt iets vaker voor bij mannen

LBD

Lewy Body Dementie

Oorzaak: lewylichaampjes in de zwarte hersenkernen (beweegklachten) en in de hersenschors(geheugenklachten)

Verschijnselen

- Geheugenproblemen, in eerste instantie licht moeite met benoemen van dingen, orientatie in ruimte en verminderde concentratie. Later ook de weg en tijdsbesef kwijtraken, hallucinaties en waanbeelden
- Toenemende beweegklachten
- Zowel de lichamelijke als de geestelijk klachten kunnen sterk wisselen
- De cognitieve klachten ontstaan nadat de hallucinaties zijn begonnen
- De geestelijke achteruitgang is ernstiger als bij de ZVP en begint ook sneller, meestal binnen een jaar nadat de beweegklachten zijn ontstaan

Verloop

Levensverwachting hangt af van diverse factoren o.a. de leeftijd waarop het is ontstaan

Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen

CBD

Corticobasale degeneratie

Oorzaak: taueiwit in de dieper gelegen kernen (basale kernen)

Verschijselen

- Start met klachten aan 1 zijde van het lichaam
- Toenemende stijfheid en onhandigheid aan 1 zijde , lijdend tot verkrampingen
- Onwillekeurig schokken
- Verlies van controle waardoor arm of been een eigen leven lijkt te lijden (alien limb)
- Onhandigheid bij ADL
- Bewegingstraagheid, balansproblemen
- Moeite met slikken en spreken
- Cognitieve klachten: woordvindproblemen, geheugenverlies, gedragsproblemen (apathie, snel geïrriteerd, depressie)

Verloop

start ca 50-70 jaar

Overlijden 6-10 jaar maar kan ook later

Vasculair parkinsonisme

Oorzaak: schade aan de bloedvaatjes in de diepe witte stof van de hersenen

Verschijselen

- Afhankelijk van welk deel van de hersenen is beschadigd
- Bewegingstraagheid vaak in het onderlichaam
- Hakkende zachte spraak
- Dementieklachten

Verloop

Hangt af van de schade

Medicatie geeft vaak weinig verbetering

Overig

Medicamenteus/ toxisch parkinsonisme

Ontstaat na inname medicatie of door blootstelling aan giftige stoffen

Verlagen of stoppen van de medicatie kan verlichting geven

Medicamenteus komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen